



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

DRENAŻ WENTYLACYJNY

OPIS ZABIEGU

To operacja przeprowadzana głównie u dzieci, rzadziej u dorosłych, z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego i niedosłuchem. Polega na umieszczeniu w błonie bębenkowej szpulki (drenika wentylacyjnego). U dzieci łącznie z tym zabiegiem wykonywana jest na ogół adenotomia (usunięcie III migdałka) w celu odblokowania trąbek słuchowych. Szpulki zakłada się na okres 9-12 miesięcy, w tym czasie nie wolno zamoczyć ucha. U dzieci zabieg przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym, u dorosłych może to być znieczulenie miejscowe. Przy zaniechaniu leczenia możliwe jest pogorszenie stanu zdrowia. Nie ma alternatywnej metody leczenia.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia (mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia) oraz z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędów to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością). Po zabiegu założenia szpułek mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania.

Częste lecz niegroźne:

- Wypadnięcie szpulki;
- Niedrożność szpulki (zatkanie przez wydzielinę), nie spełnia swojej funkcji;
- Skaleczenie i stan zapalny przewodu słuchowego zewnętrznego;
- Krwaki błony bębenkowej lub w jamie bębenkowej;
- Stan zapalny ucha środkowego;
- Po planowym usunięciu drenażu brak dobrego efektu leczenia i konieczność powtórzenia zabiegu.

Rzadkie, dużo poważniejsze:

- Przetrwiała perforacja (dziurka) błony bębenkowej;
- Powstanie perlaka w jamie bębenkowej.

Powikłania kazuistyczne, tj. pojedyncze przypadki opisane w literaturze:

- Pogorszenie słuchu z głuchotą włącznie;

- Porażenie nerwu twarzowego;
- Wypadnięcie funkcji lub zapalenie błędnika, zawroty głowy;
- Zaburzenia smaku.

Wymieniono większość następstw i powikłań, które mogą wystąpić ale w medycynie zawsze może dojść do sytuacji jeszcze nieopisywanych w literaturze fachowej, związanych z nietypową anatomią lub nietypową reakcją organizmu pacjenta. Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami należy się zgłaszać do lekarza prowadzącego.