



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

OPERACJA TORBIELI ŚRODKOWEJ SZYI

OPIS ZABIEGU

Torbiel środkowa szyi jest wadą wrodzoną i w większości przypadków jest to niebolesny sprężysty guz na przedniej powierzchni szyi, tuż powyżej krtani. Okresowo może pojawiać się nagły, szybki wzrost lub stan zapalny, obejmujący wszystkie sąsiednie tkanki. Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu. Operację wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Usuwany jest fragment kości gnykowej. Cięcie skórne jest poziome, w linii środkowej szyi. Liczba powikłań przy operacji jest znacząco większa gdy torbiel była nakłuwana w celu spuszczenia płynu, była w stanie zapalnym i w przypadkach reoperacji. Przy zaniechaniu leczenia możliwe jest pogorszenie stanu zdrowia. Nie ma alternatywnej metody leczenia.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia (mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia) oraz z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędów to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością). Po zabiegu operacji torbieli środkowej szyi mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania.

Częste lecz niegroźne:

- Krwawienie po zabiegu, wymagające rewizji rany;
- Obrzęk, zasinienie, ból okolicy operowanej;
- Odma podskórna na szyi;
- Wznowa torbieli lub utworzenie się skórnej przetoki pooperacyjnej.

Rzadkie, dużo poważniejsze:

- Bardzo rzadko krwawienie po zabiegu może powodować narastanie krwiaka i obrzęku w krtani, nawet wyjątkowo może wymagać wykonania pilnej tracheotomii (otworu do oddychania w przedniej części szyi);
- Bardzo rzadko: porażenie fałdów głosowych;
- Bardzo rzadko: skaleczenie gardła dolnego i przetoka gardłowa.

Po każdym rozległym zabiegu chirurgicznym mogą wystąpić poważne powikłanie ogólne: Zapalenie płuc, zatory i zakrzepy żyłne, udar mózgu, zakażenie ogólnoustrojowe, zawał mięśnia sercowego, niewydolność oddechowa i zgon

Wymieniono większość następstw i powikłań, które mogą wystąpić ale w medycynie zawsze może dojść do sytuacji jeszcze nieopisywanych w literaturze fachowej, związanych z nietypową anatomią lub nietypową reakcją organizmu pacjenta. Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami należy się zgłaszać do lekarza prowadzącego.