



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Kędzierzynie-Koźlu

## **OPERACJA ZATOKI SZCZĘKOWEJ Z DOJŚCIA PODWARGOWEGO**

### **OPIS ZABIEGU**

Wskazana jest w przewlekłym zapaleniu zatoki szczękowej w przypadku braku możliwości jej oczyszczenia na drodze endoskopowej lub w przypadku podejrzenia nowotworu w celu pobrania wycinka do badania histologicznego aby ustalić rozpoznanie. Może być wykonana w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Przy zaniechaniu leczenia możliwe jest pogorszenie stanu zdrowia. Nie ma alternatywnej metody leczenia.

### **MOŻLIWE POWIKŁANIA**

Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia ( mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia) oraz z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością). Po zabiegu operacji zatoki szczękowej z dojsčia podwargowego mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania.

Częste lecz niegroźne:

- Krwawienie wczesne (do 24h), może wymagać tamponady;
- Krwawienie późne (najczęściej do 7 doby, rzadko-późniejsze), może wymagać tamponady;
- Odma na twarzy, odma w obrębie powiek po stronie operowanej;
- Obrzęk, zasinienie, ból w okolicy policzka, ropień policzka;
- Zapalenie kości;
- Dolegliwości o charakterze neuralgii nerwu podczodołowego;
- Rozejście się rany w przedsionku jamy ustnej;
- Bardzo rzadko: przetrwała komunikacja (przetoka) pomiędzy zatoką a jamą ustną.

Rzadkie, dużo poważniejsze:

- Masywne krwawienie wymagające podwiązania tętnicy na szyi.

Wymieniono większość następstw i powikłań, które mogą wystąpić ale w medycynie zawsze może dojść do sytuacji jeszcze nieopisywanych w literaturze fachowej, związanych z nietypową anatomią lub nietypową reakcją organizmu pacjenta. Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami należy się zgłaszać do lekarza prowadzącego.