



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie-Koźlu

PLASTYKA GARDŁA I PODNIEBIENIA W PRZYPADKACH BEZDECHU I CHRAPANIA (UPPP)

OPIS ZABIEGU

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Przy zaniechaniu leczenia możliwe jest pogorszenie stanu zdrowia. Nie ma alternatywnej metody leczenia.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia (mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia) oraz z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością). Po zabiegu UPPP mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania.

Częste lecz niegroźne:

- Obrzęk, ból gardła, ból uszu;
- Krwawienie z gardła – wczesne (w 1dniu);
- Krwawienie późne (w dniach kolejnych, głównie do 7 doby);
- Odma na szyi;
- Zmiana barwy głosu, nosowanie;
- Powiększenie i ból węzłów chłonnych szyi w pierwszych dniach po zabiegu;
- Zaburzenia smaku i czucia w gardle;
- Zaburzenia połykania utrzymujące się 2 - 3 tygodnie;
- Następstwa odległe jak suchość w gardle, pieczenie, częstsze pojawianie się chryпки.

Rzadkie lecz dużo poważniejsze:

- Silne krwawienie wymagające zaszycia nisz migdałkowych lub uśpienia pacjenta i wytamponowania gardła dolnego.

Wymieniono większość następstw i powikłań, które mogą wystąpić ale w medycynie zawsze może dojść do sytuacji jeszcze nieopisywanych w literaturze fachowej, związanych z nietypową anatomią lub nietypową reakcją organizmu pacjenta. Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami należy się zgłaszać do lekarza prowadzącego.