



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie-Koźlu

PLASTYKA PODNIEBIENIA W PRZYPADKACH BEZDECHU I CHRAPANIA (UPP) LUB PLASTYKA LESEROWA (LAUP)

OPIS ZABIEGU

Zabieg jest wykonywany najczęściej w znieczuleniu miejscowym. Przy zaniechaniu leczenia możliwe jest pogorszenie stanu zdrowia. Nie ma alternatywnej metody leczenia.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia (mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia) oraz z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością). Po zabiegu mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania.

Częste lecz niegroźne:

- Obrzęk i ból gardła, ból uszu, utrzymujący się około 2 tygodni
- Krwawienie z gardła – wczesne (w 1dniu)
- Krwawienie późne (w dniach kolejnych, głównie do 7 doby)
- Odma na szyi
- Zmiana barwy głosu, nosowanie otwarte
- Zaburzenia smaku
- Zaburzenia czucia w gardle, poczucie ciała obcego.

Rzadkie, dużo poważniejsze:

- Silne krwawienie wymagające zaszycia nisz migdałkowych lub uśpienia pacjenta i wytamponowania gardła dolnego
- Przedostawanie się pokarmów i płynów do nosa.

Wymieniono większość następstw i powikłań, które mogą wystąpić ale w medycynie zawsze może dojść do sytuacji jeszcze nieopisywanych w literaturze fachowej, związanych z nietypową anatomią lub nietypową reakcją organizmu pacjenta. Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami należy się zgłaszać do lekarza prowadzącego.