



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

ROZSZERZANIE (DIWULSJA) ODBYTU

OPIS ZABIEGU

Rozszerzanie (diwulsja) odbytu jest zabiegiem wykonywanym w znieczuleniu ogólnym (dokładnych informacji na temat znieczulenia i możliwych jego powikłań udzieli lekarz anestezjolog podczas badania), polegającym na ręcznym poszerzaniu kanału odbytu poprzez rozciąganie i rozmasowywanie palcami mięśni zwieraczy odbytu. Celem zabiegu jest czasowe rozluźnienie tych mięśni, co stwarza korzystne warunki do gojenia się szczeliny przy zastosowaniu dalszego leczenia zachowawczego (nasiadówki ze środków odkażających).

MOŻLIWE POWIKŁANIA

Zabieg operacyjny nie przebiega identycznie u każdego chorego. Zależy to od jego budowy anatomicznej, stanu odżywienia, chorób współistniejących oraz od jego stanu ogólnego. Różne, trudne do przewidzenia trudności techniczne występujące podczas zabiegu operacyjnego mogą spowodować, że pomimo starań lekarzy podczas operacji, jak i po jej zakończeniu może dojść do wystąpienia powikłań. Do powikłań tych należą:

- niezagojenie się lub nawrót szczeliny i związanych z nią dolegliwości;
- przejściowe lub trwałe nietrzymanie gazów lub/i stolca o różnym nasileniu;
- powikłania związane z zakładaniem i obecnością wkłuc dożylnych (miejscowa infekcja, krwiak, obrzęk, zakażenie wkłucia);
- powikłania ze strony układu krążenia – nasilenie niewydolności krążenia, zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego;
- niekiedy mogą wystąpić uszkodzenia lub oparzenia skóry przez środki dezynfekujące;
- alergie na leki stosowane w okresie okołoperacyjnym – szczególnie leki stosowane podczas znieczulenia, antybiotyki oraz środki przeciwbólowe;
- zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B i C (tzw. żółtaczką zakaźną) lub HIV.