



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie-Koźlu

USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH (TONSILLEKTOMIA)

OPIS ZABIEGU

Polega na usunięciu obu migdałków znajdujących się w cieśni gardła. Celem jest wyeliminowanie nawracających angin oraz utajonego ogniska zakażenia, siejącego na cały organizm. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia (mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia) oraz z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością). Po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania.

Częste lecz niegroźne:

- Obrzęk języczka, ból gardła, ból uszu
- Krwawienie z gardła – wczesne (w 1dniu)
- Krwawienie późne (w dniach kolejnych, głównie do 7 doby)
- Odma na szyi
- Zmiana barwy głosu, nosowanie
- Powiększenie i ból węzłów chłonnych szyi w pierwszych dniach po zabiegu
- Następstwa odległe jak suchość w gardle, pieczenie, częstsze pojawianie się chryпки

Rzadkie, dużo poważniejsze:

- Silne krwawienie wymagające zaszycia nisz migdałkowych i uśpienia pacjenta i wytamponowania gardła dolnego, ropień w obrębie gardła.

Wymieniono większość następstw i powikłań, które mogą wystąpić ale w medycynie zawsze może dojść do sytuacji jeszcze nieopisywanych w literaturze fachowej, związanych z nietypową anatomią lub nietypową reakcją organizmu pacjenta. Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami należy się zgłaszać do lekarza prowadzącego.