



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

### **USUNIĘCIE POLIPA CHOANALNEGO**

#### **OPIS ZABIEGU**

Polip choanalny to twór, który wypełnia nosogardło ale jego szczytuła jest najczęściej zlokalizowana w okolicy zatoki szczękowej lub obramowania nozdrzy tylnych. Usunięcie zmiany wykonywane jest najczęściej metodą funkcjonalnej endoskopowej chirurgii zatok przynosowych (FESS) lub gdy jest to niemożliwe z przyczyn anatomicznych, także poprzez otwarcie zatoki szczękowej z cięcia podwargowego. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Przy zaniechaniu leczenia możliwe jest pogorszenie stanu zdrowia. Nie ma alternatywnej metody leczenia.

#### **MOŻLIWE POWIKŁANIA**

Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia ( mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia) oraz z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością). Po zabiegu usunięcia polipa choanalnego mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania.

Częste lecz niegroźne:

- Krwawienie wczesne (do 24h), może wymagać ponownej tamponady lub operacyjnego zaopatrzenia
- Krwawienie późne (najczęściej do 7 doby, rzadko-późniejsze), może wymagać tamponady
- Obrzęk, zasinienie, ból w okolicy policzka, ropień policzka
- Obrzęk, zasinienie, ból w okolicy nosa i oczodołu, zapalenie tkanek oczodołu
- Formowanie się strupów → Konieczność oczyszczania nosa i nakładania maści,
- Rozwój zrostów wewnątrznosowych
- Zapalenie kości
- Dolegliwości o charakterze neuralgii nerwu podoczodołowego
- Rozejście się rany w przedsionku jamy ustnej
- Ponowny odrost polipa choanalnego, zwłaszcza po zabiegu prowadzonym wyłącznie endoskopowo
- Bardzo rzadko: trwałe brak węchu po zabiegu.

Rzadkie, dużo poważniejsze:

- Masywne krwawienie wymagające podwiązania tętnicy na szyi

- Bardzo rzadko: krwiałk oczodołu
- Bardzo rzadko: utrwalone objawy ze strony oczodołu: dwojenie, łzawienie
- Bardzo rzadko: płynotok, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, konieczność przeprowadzenia zabiegu naprawczego.

Wymieniono większość następstw i powikłań, które mogą wystąpić ale w medycynie zawsze może dojść do sytuacji jeszcze nieopisywanych w literaturze fachowej, związanych z nietypową anatomią lub nietypową reakcją organizmu pacjenta. Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami należy się zgłaszać do lekarza prowadzącego.