Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie-Koźlu

ZGODA NA BADANIE URODYNAMICZNE

OPIS BADANIA

Badanie urodynamiczne składa się z części nieinwazyjnej polegającej na oddaniu moczu do urządzenia zwanego przepływomierzem lub uroflowmetrem oraz części inwazyjnej. Podczas tej części badania wprowadzany jest do pęcherza moczowego przez cewkę moczową cieńki jednorazowy cewnik służący do napełniania pęcherza i pomiaru ciśnienia w pęcherzu. Drugi cewnik zakończony balonikiem jest wprowadzany do odbytu i służy do pomiaru ciśnienia panującego w jamie brzusznej. Wokół odbytu przyklejane są elektrody rejestrujące czynność zwieraczy. Właściwe badanie trwa około pół godziny i polega na wolnym napełnianiu pęcherza moczowego obojętnym płynem o temperaturze pokojowej. W tym czasie prowadzony jest zapis ciśnień panujących w pęcherzu i jamie brzusznej. Osoba badana proszona jest o kaszel, zmianę pozycji lub parcie tłocznią brzuszną. Napełnianie pęcherza kończy się w chwili uczucia silnego parcia na pęcherz zgłoszonego przez osobę badaną. Następnie odbywa się opróżnianie pęcherza(mikcja) do przepływomierza w pozycji siedzącej lub na stojąco(mężczyźni). W razie jakichkolwiek dolegliwości podczas badania może ono zostać w każdej chwili przerwane. Badanie kończy się usunięciem cewników i elektrod.Po badaniu wydany zostanie osobie chorej opis badania wraz z wnioskami i propozycją dalszego postępowania oraz recepta na odpowiednie leki.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

W ciągu pierwszych kilku dni po badaniu mogą wystąpić objawy podrażnienia pęcherza lub cewki (niewielkie uczucie pieczenia podczas oddawania moczu, częstsze parcie). Dolegliwości te powinny ustąpić do trzech dni po badaniu. W razie większego nasilenia dolegliwości lub dłuższego czasu trwania objawów proszę o kontakt z lekarzem prowadzącym badanie.kJ. W rzadkich przypadkach na skutek badania mogą wystąpić takie powikłania jak krwiomocz, reakcja alergiczna miejscowa lub uogólniona na środki lub materiały stosowane w badaniu, 14 6e0 -0 zakażenie dróg moczowych. W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych zostanie udzielona (j choremu niezwłocznie specjalistyczna pomoc Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami należy się zgłaszać do lekarza prowadzącego.